

PROCULIN® TEARS

Oftalmološki rastvor za podmazivanje i vlaženje oka

0,2% natrijum hijaluronat

10 ml

Sastav: natrijum hijaluronat (0,2% w/v), dvobazni natrijum fosfat dodekahidrat, monobazni natrijum fosfat monohidrat, natrijum hlorid, natrijum edetat, benzalkonijum hlorid, voda za injekcije.

Šta je to?

Proculin® Tears kapi za oči su sterilni rastvor koji sadrži natrijum hijaluronat.

U kojem obliku dolazi?

Proculin® Tears dolazi u vidu rastvora kapi za oči u bočici od 10 ml.

Kada ih treba koristiti?

Proculin® Tears je oftalmološki rastvor natrijum hijaluronata visoke molekularne mase, dobijen putem biotehnološke sinteze. Natrijum hijaluronat je supstanca koja formira mukomimetičke rastvore, sa optimalnim podmazivačkim svojstvima zbog viskoznosti rastvora što za rezultat ima hidratantni efekat i stabilizaciju suznog filma.

Podmazivačka, ovlaživačka i zaštitna svojstva natrijum hijaluronata ublažavaju osjećaje iritacije, suvoće, žarenja i osjećaja prisustva stranih tijela zbog prirodnih uticaja (vjetar, sunce, dim, suv vazduh), vizuelnog stresa (prekomjerna svjetlost i dugotrajna upotreba računara) ili mehaničkih faktora (upotreba kontaktnih sočiva nakon operacije oka), pružajući dugotrajno olakšanje.

Kako koristiti?

1 kap u oko jednom ili više puta dnevno, prema potrebi.

Upozorenja i mjere opreza

- Proizvod je namijenjen isključivo za spoljašnu oftalmološku upotrebu.
- Ne koristiti ukoliko je bočica oštećena.
- Ne koristiti ukoliko postoji preosjetljivost na neki sastojak proizvoda.
- Ne dodirivati oko vrhom bočice.
- Ne koristiti nakon datuma isteka roka trajanja koji je naveden na pakovanju.
- Nakon primjene, u rijetkim slučajevima, može doći do blagog prolaznog zamućenja vida zbog viskoznosti rastvora. Zbog toga se preporučuje da se sačeka dok zamućenost ne prođe a prije bilo kakvih aktivnosti koje zahtijevaju jasan vid.
- Sačekajte barem 10-15 minuta prije primjene bilo kojeg drugog lijeka za oči.
- Nakon otvaranja bočice, proizvod se može koristiti u roku od 30 dana.
- Nemojte nositi kontakta sočiva tokom primjene ovog proizvoda i nemojte ih vraćati u oko najmanje 15 minuta nakon primjene.
- Benzalkonijum hlorid se može apsorbovati u meko kontaktno sočivo izazivajući promjenu njegove boje.
- Benzalkonijum hlorid može izazvati iritaciju oka. Obratite se Vašem ljekaru ako osjećate neuobičajene senzacije oka, peckanje ili bol nakon upotrebe ovog proizvoda.
- Čuvati van vidokruga i domašaja djece.
- Čuvati na temperaturi do 25°C.
- Ne gutati.

Datum poslednje revizije teksta: januar 2021.



Proizvođač: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 – 56121, Pisa, Italija

Nosilac upisa u Registar: ALKALOID d.o.o. Sarajevo
Isevića Sokak 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina



Propisno ukloniti nakon upotrebe.



0546

